




## TUDATOS FÉREGHAJTÁSI PROGRAM - TÁJÉKOZTATÓ

A **tünetes** lovak féregellenes kezelésekor a legfontosabb férgek az ún. **strongylidák**. Minden lóban megtalálhatóak, legtöbbször teljesen tünetmentesen, de a tömeges fertőzés súlyos, akár életveszélyes kórképet okozhat.


### Tudtad?

 A lovak 3 csoportba sorolhatók az alapján, hogy mennyi strongylida-petét ürítenek: **alacsony**, **közepes**, és **magas** peteszám

 Egy állományban az összes strongylida pete **80%-át a lovak kb. 20%-a üríti (ábra)**

 A peteürítés mértékét genetikai hajlam is befolyásolja

 A túl gyakori féreghajtás gyógyszer-rezisztenciát alakíthat ki



Ezért nem kezelhetünk minden lovat egyformán!

### A megoldás:

Bélsár peteszám meghatározás

Egyénre szabott éves féreghajtási terv

 Alacsony → évi 1 féreghajtás

 Közepes → évi 2 féreghajtás

 Magas → évi 3 féreghajtás

Így:

- ✓ Megelőzhetjük a súlyos fertőzéseket
- ✓ Csökkenthetjük a rezisztencia kialakulását
- ✓ Elkerülhetjük a felesleges gyógyszerhasználatot

### **Költségek:**


1 ló - 8000 Ft


10 ló felett - 7000 Ft / ló


20 ló felett - 6500 Ft / ló

A költségeket mintaátadáskor készpénzben vagy bankkártyával, illetve utólagos átutalással lehet rendezni.

### **Mit tartalmaz a csomag?**

 Bélsár peteszám meghatározás

 Elektronikus eredményközlés egyedre szabott éves féreghajtási tervvel

 Fals negatív eredményt adhat a vizsgálat, ha a ló:

- moxidektint tartalmazó féreghajtót kapott 4 hónapon belül
- ivermektint tartalmazó féreghajtót kapott 3 hónapon belül
- pyrantelt vagy fenbendazolt tartalmazó féreghajtót kapott 2 hónapon belül
- nem megfelelő mintatárolás esetén

 Ha ló a faroktövét vakarja, ez a vizsgálat **nem** alkalmas a probléma diagnosztizálására!

Ha bármilyen kérdés felmerült benned, keress bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

[drtruroxana@gmail.com](mailto:drtruroxana@gmail.com)

+36703389051

Dr. Trúzsi Roxána, Polequi Bt.